



DONIRANJE KRVI

IZ FAVORITA ZAVRŠIO
OBRAVNTAVANJE
SARAJEVO

IZ FAVORITA ZAVRŠIO
OBRAVNTAVANJE
SARAJEVO

NAKON COVID-19 VAKCINACIJE



(<https://w>)

TRANSFUZIJA KRVI JE NEOPHODNA



ženama sa komplikacijama u trudnoći



djeci sa teškim anemijama koje su rezultat malnutricije



osobama nakon teških trauma i nesretnih slučajeva



osobama tokom kompleksnih operativnih procedura i onkološkim pacijentima



Ukoliko ste primili vakcinu protiv COVID-19, možete donirati krv, trombocite i plazmu uz određene mjere opreza! Doniranje krvi je ključno za spašavanje života i potpora je naporima zdravstvenih radnika u borbi tokom pandemije.

Bez obzira na vrstu vakcine koju je osoba primila, donor ne smije imati simptome oboljenja i mora se osjećati dobro u vrijeme doniranja krvi. Ako osoba ima bilo kakve nuspojave vakcine protiv COVID-19, savjetuje se odgoditi doniranje krvi dok se osoba ne bude osjećala bolje.

Kod donora krvi koji se osjećaju dobro a vakcinisani su inaktiviranim, nerekplicirajućim ili mRNA zasnovanim vakcinama protiv COVID-19 (AstraZeneca, Janssen /J&J, Moderna, Novavax ili Pfizer) nema potrebe za pauzom za doniranje krvi. Donori krvi koji su primili živu, oslabljenu COVID-19 vakcinu ili ne znaju koju su vrstu COVID-19 vakcine primili, moraju sačekati dvije sedmice od dana primanja vakcine prije doniranja krvi.



MJERE PREDOSTROŽNOSTI



Da bi osigurala sigurnost svih učesnika, ustanova/organizacija koja prikuplja donacije krvi treba da poduzme dodatne sigurnosne mjere tokom pandemije, uključujući:

- Provjeru temperature donora i osoblja prije ulaska u prostore za donaciju krvi,
- Svi donori i osoblje moraju nositi zaštitnu masku za lice i/ili ličnu zaštitnu opremu prema smjernicama kriznog štaba Federacije BiH, odnosno kantonalnog kriznog štaba
- Slijedom smjernica fizičkog distanciranja u prostorima za čekanje i osvježenje, kao i prostoru gdje su smješteni kreveti za donore krvi, mora se osigurati udaljenost od 2m između osoba, gdje je to moguće
- Potrebno je često čistiti područja kojima se kreću donori i pojačati dezinfekciju površina i opreme
- Obezbijediti lako dostupno sredstvo za dezinfekciju ruku
- Osoblje treba da nosi rukavice i često ih mijenja
- Izbjegavati pokrivanje donora sa dekama
- Sprovoditi mini test fizičkog napora donora kako bi se osiguralo da je osoba zaista u punom zdravlju.

